

水痘疫苗

水痘疫苗是一種活性減毒疫苗,可有效避免嚴重的水痘症狀。接種水痘疫苗後若仍感染水痘,其症狀亦較輕微,可能會產生較少的水痘,且較不會發燒,復原較快。

接種禁忌及注意事項

- 先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 已知患有嚴重免疫缺失者(包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫 缺失症與白血病、淋巴瘤等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者)。
- 孕婦。
- 發燒或正患有急性中重度疾病者,宜待病情穩定後再接種。
- 接種前 24 小時內曾接受特定抗病毒藥物者(如:acyclovir、famciclovir 或 valacyclovir),於接種後間隔 14 天以後再重新開始服用這些藥物。
- 女性接種後 4 週內應避免懷孕。
- 接種後皮膚出現紅疹者,應避免接觸嚴重免疫不全者。
- 接受一般肌肉注射免疫球蛋白治療或 B 型肝炎免疫球蛋白(HBIG)者,宜間隔 3 個月後再接種。
- 輸過血或接受靜脈注射血液製品者,宜間隔 6 個月後再接種。小於 1 歲之麻疹個 業接觸者,如已施打肌肉注射免疫球蛋白(IMIG),應間隔 6 個月以上再接種 MMR 或水痘疫苗。
- 曾靜脈注射高劑量($\geq 1\text{g/kg}$)免疫球蛋白治療時,宜間隔 11 個月後再接種。
- 其他經醫師評估不適宜接種者。

接種後可能發生的反應

- 接種部位可能有發紅、疼痛或腫脹等局部反應。
- 可能有輕微的發燒,偶有發生高燒,抽搐之現象
- 接種後 5-26 天於注射部位或身上可能出現類似水痘的水泡。
- 與自然感染水痘病毒一樣,疫苗的病毒可能潛伏在體內,在免疫功能低下時,病毒再活化而表現成帶狀泡疹,但其發生率與症狀都低於自然感染

★18 歲以下兒童接種水痘疫苗後 6 週內宜避免使用水楊酸類藥品(salicylates)。