

白喉破傷風非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺混合疫苗

4 合 1 疫苗(DTaP-IPV)

接種禁忌及注意事項

- 先前接種白喉破傷風百日咳相關疫苗及小兒麻痺疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 接種含百日咳疫苗後 7 天內曾發生腦病變,且無其他可解釋病因者。
- 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者,宜於醫師判斷病情已經穩定後才注射疫苗。
- 發燒或正患有急性中重度疾病者,宜待病情穩定後再接種。
- 先前接種含破傷風疫苗後 6 週內曾發生過 Guillain-Barré Syndrome (GBS) “者”。
- 曾接種含破傷風類毒素疫苗後,發生 Arthus 過敏反應者,與次劑含破傷風類毒素疫苗應間隔 10 年以上再接種。
- 不適宜接種含百日咳疫苗者,可改接種破傷風減量白喉混合疫苗(Td)。
- 其他經醫師評估不適宜接種者。

接種後可能反應

★接種部位可能有紅腫、疼痛現象,偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。上述反應,通常都是短暫的,會在數日內恢復,請勿揉、抓注射部位。

○如接種部位紅腫十分嚴重或經過數日不退、出現化膿或持續發燒,請儘速就醫。