

# 白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺

## 五合一疫苗

### 疫苗簡介

五合一疫苗是一種注射式的不活化疫苗,可以同時預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺以及 b 型嗜血桿菌等五種幼兒傳染病,並且將舊型三合一疫苗中的全細胞性百日咳成分,改為非細胞性百日咳,可大幅減少接種後發生注射部位紅腫、疼痛或發燒等不良反應的機率,另外也用不活化小兒麻痺疫苗取代口服小兒麻痺疫苗(OPV),以避免機率極低的疫苗相關小兒麻痺症(VAPP)的發生。

### 接種禁忌及注意事項

- 已知對 neomycin polymyxin streptomycin 或本疫苗中任何成份過敏者。
- 過去接種白喉、破傷風、百日咳混合疫苗、不活化小兒麻痺疫苗或 b 型嗜血桿菌疫苗之後,曾發生嚴重之過敏或不良反應者。
- 先前接種含百日咳之疫苗 7 天後曾發生不明原因之腦或神經系統病變者。
- 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者。但已不再進行的神經系統疾病,如腦性麻痺等,則不在此限。
- 接種當日正在發燒或罹患急性疾病者,宜延後接種,但一般感冒則不在此限。
- 本項疫苗不建議用於超過 7 歲的孩童或成人,因為所含的白喉類毒素及百日咳抗原的量可能引起較大的局部反應、發燒與不適。
- 其他經醫師評估不適宜接種者。

### 接種後可能反應

- 接種後 1-3 天可能發生注射部位紅腫、酸痛,偶爾有哭鬧不安、疲倦、食慾不振或嘔吐等症狀,通常 2-3 天後會恢復,請勿揉、抓注射部位。
- 不停啼哭或發高燒之症狀則較為少見,而嚴重不良反應如嚴重過敏、昏睡或痙攣則極為罕見。
- 如接種部位紅腫持續擴大、接種後持續高燒超過 48 小時,或發生嚴重過敏反應及嚴重不適症狀,則應儘速請醫師處理。