

# B 型肝炎疫苗

## 接種禁忌

- 出生後觀察 48 小時,嬰兒外表、內臟機能及活動力欠佳者。
- 出生體重未達 2000 公克(出生 1 個月後或體重超過 2000 公克,即可 注射)。
- 有窒息、呼吸困難、心臟機能不全、嚴重黃疸(血清總膽色素大於 15mg/ml)、昏迷或抽搐等嚴重病情者。
- 有先天性畸形及嚴重的內臟機能障礙者。
- 其他經醫師評估不適宜接種者。

## 接種後可能發生的反應及注意事項

- 接種部位很少發生特別的反應,偶爾有局部紅腫、微熱、硬塊等症狀或輕微發燒,最常見的是局部酸痛。
- 接種後,請多喝水、多休息,如有特殊反應時,可至轄區衛生所或 醫院診治處理。
- 若接種後一個月內有黃疸或食點明顯減退者,請速至醫院診治,並 通知衛生局或各區衛生所。

## 未接種 B 型肝炎疫苗可能引起之後果

- 早期預防注射能有效預防 B 型肝炎的感染,台灣地區為 B 型肝炎高 感染地區,年幼時期的感染易演變成慢性帶原者,且肝癌、肝硬化 為我國成人主要死因之一,都與 B 型肝炎慢性帶原者有密切關係。